

	Адвантейдж spot-on	Адвантикс spot-on	Адвокат spot-on	Байкокс 5% перорально	Байтрил 2,5% подкожно	Байтрил 2,5% перорально	Профендер spot-on	Дронтал перорально	Дронтал со вкусом мяса перорально
морская свинка	0,1 мл/кг повтор через 2-4 недели при необходимости	0,1 мл/кг повтор через 2-4 недели при необходимости	0,1 мл/кг повтор через 2-4 недели при необходимости	0,4 мл/кг однократно	0,2 мл/кг 2/сутки или 0,4 мл/кг 1/сутки 7 дней	0,2 мл/кг 2/сутки или 0,4 мл/кг 1/сутки, либо 0,2-1мл/100 мл воды, 7 дней	не применяется	не применяется	не применяется
крыса	0,1 мл/кг повтор через 2-4 недели при необходимости	0,1 мл/кг повтор через 2-4 недели при необходимости	0,2 мл/кг повтор через 2-4 недели при необходимости	0,4 мл/кг однократно	0,2 мл/кг 2 раза в сутки 7 дней	0,2 мл/кг 2 раза в сутки или 0,2-1мл/100 мл воды 7 дней	не применяется	не применяется	не применяется
мышь	0,01 мл/100 г МТ повтор через 2-4 недели при необходимости	не используется	0,02 мл/100 г МТ повтор через 2-4 недели при необходимости	0,04 мл/100 г МТ однократно	0,02 мл/100 г МТ 2 раза в сутки или 0,04 мл/100 г МТ 1 раз в сутки 7 дней	0,02 мл/100 г МТ 2/сутки или 0,04 мл/100 г МТ 1/сутки, либо 0,2-1мл/100 мл воды, 7 дней	не применяется	не применяется	не применяется
хомяк	0,01 мл/100 г МТ повтор через 2-4 недели при необходимости	0,01 мл/100 г МТ повтор через 2-4 недели при необходимости	0,01 мл/100 г МТ повтор через 2-4 недели при необходимости	0,04 мл/100 г МТ однократно	0,02 мл/100 г МТ 2/сутки или 0,04 мл/100 г МТ	0,02 мл/100 г МТ 2/сутки или 0,04 мл/100 г МТ	не применяется	не применяется	не применяется

					1/сутки 7 дней	1/сутки, либо 0,2- 1мл/100 мл воды, 7 дней			
хорек	0,1 мл/кг повтор через 2- 4 недели при необходимости	0,1 мл/кг повтор через 2- 4 недели при необходимости	0,1 мл/кг повтор через 2- 4 недели при необходимости	0,4 мл/кг однократно	0,2 мл/кг 2/сутки или 0,4 мл/кг 1/сутки 7 дней	0,2 мл/кг 2/сутки или 0,4 мл/кг 1/сутки 7 дней	не применяе тся	не применяе тся	не применяе тся
ёж	0,1 мл/кг повтор через 2- 4 недели при необходимости	не применяется	0,4 мл/кг повтор через 2- 4 недели при необходимости	0,4 мл/кг однократно	0,5 мл/кг 1 раз в сутки 7 дней	0,2 мл/кг 2 раза в сутки 7 дней	не применяе тся	не применяе тся	не применяе тся
шиншилла	0,1 мл/кг повтор через 2- 4 недели при необходимости	0,1 мл/кг повтор через 2- 4 недели при необходимости	не применяется	0,4 мл/кг однократно	0,2-0,4 мл/кг 2 раза в сутки 7 дней	0,2-0,4 мл/кг 2 раза в сутки 7 дней	не применяе тся	не применяе тся	не применяе тся
кролик	0,1 мл/кг повтор через 2- 4 недели при необходимости	0,1 мл/кг повтор через 2- 4 недели при необходимости	0,1 мл/кг повтор через 2- 4 недели при необходимости	0,2 мл/кг 2 дня подряд, повторить через 5 дней	0,2 мл/кг 2/сутки или 0,4 мл/кг 1/сутки 7 дней	0,2 мл/кг 2/сутки или 0,4 мл/кг 1/сутки 7 дней	0,14 мл/кг	1 таб./4 кг	1 таб./10 кг
рептилии	не применяется	не применяется	0,2-0,4 мл/кг повтор через 2- 4 недели при необходимости	0,4 мл/кг однократно	0,2 мл/кг каждые 24- 48 часов 7 дней	0,2 мл/кг каждые 24- 48 часов 7 дней	1 мл/кг Для черепях 2 мл/кг	не применяе тся	не применяе тся
птица (канарейка, волнистый попугайчик)	не применяется	не применяется	не применяется	0,04 мл/100 г 2 дня	не применяется	0,04-0,06 мл/100 г МТ или 0,4-0,8 мл/100 мл воды 7 дней	не применяе тся	не применяе тся	не применяе тся